



Conduites addictives : repères pour les professionnels de santé

Dossier en ligne

<http://www.dicadd13.fr/>

Espace professionnel > Boîte à outils > Aide à la prise en charge > Professionnels de santé



Centre Hospitalier d'Allauch
Chemin des mille écus
BP 28 - 13 718 ALLAUCH cedex
Tél : 04 91 10 46 07
b.bessou@ch-allauch.fr
www.dicadd13.fr

En préambule
Tabac
Alcool
Produits illicites
Médicaments
Jeu vidéo
VIH - VHC
Réduction des risques
Sélection de sites internet

Dispositif Information Coordination Addictologie 13

2018

En préambule



Définir l'addiction

Marc Valleur, Hôpital Marmottan, 2012

[Téléchargez le document](#)



Neurobiologie de l'addiction

Jean-Pol Tassin

[Voir la vidéo](#)



Outil d'aide au repérage précoce et intervention brève : alcool, cannabis, tabac chez l'adulte

HAS, 2014, 2p.

Le but de cet outil est d'aider les professionnels de premier recours dans leur pratique courante à : évaluer de façon précoce chez les adultes la consommation des 3 substances psycho-actives les plus utilisées (alcool, tabac, cannabis) et d'en évaluer le risque, proposer une intervention brève chez les consommateurs à risque, assurer un accompagnement de manière durable afin de favoriser la réduction ou l'arrêt de ces consommations.

[Téléchargez le document](#)



Entretien motivationnel, le guide pratique

Quels sont les principes de ce nouvel outil centré sur le patient ? Comment accompagner son patient vers le changement ? Vous trouverez ces réponses dans une vidéo réalisée par Fréquence Médicale avec le Dr Anne Dansou [Voir la vidéo](#)



Tableau de durée des positivités

Drogues Info Service

Ce tableau offre un panorama des durées moyennes de détection et des seuils retenus par la communauté scientifique pour les principales drogues et les traitements de substitution.

[Consultez le tableau](#)

Soins. Bonnes pratiques en matière d'aide et de soins

Eurotox, Livret 5, 100 p.

Ce livret est structuré en quatre parties. La première consiste en une introduction générale aux usages de drogues, aux soins et à la notion de bonnes pratiques. La deuxième partie présente des pratiques de soin, la troisième se concentre sur quelques situations spécifiques récurrentes et la quatrième propose un focus sur des publics spécifiques.

[Téléchargez le livret](#)



Tabac



Arrêt de la consommation de tabac : du dépistage individuel au maintien de l'abstinence en premier recours

HAS, 2014

[Consultez le site internet](#)



Remboursement des substituts nicotiques

CNAMTS, mars 2017

[Téléchargez le document](#)



Liste des substituts nicotiques pris en charge par l'Assurance Maladie au 03/02/2017 triée, par défaut, par "Libellé CIP" puis "Date de début de prise en charge"

[Téléchargez la liste](#)



Patches de nicotine : ne pas changer de marque si le patient est équilibré - Point d'Information

ANSM, 29/01/2018

Suite à un signalement de pharmacovigilance, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) souhaite attirer l'attention des professionnels de santé et des patients sur le fait que les dispositifs transdermiques (patches) de nicotine utilisés dans le sevrage tabagique ne peuvent se substituer l'un à l'autre.

[Lire le point d'information](#)



Arrêt du tabac dans la prise en charge du patient atteint de cancer - Systématiser son accompagnement

INCa, 04-2016, Collection Outils pour la pratique / Outils médecins traitants

. Ce document est interactif.

[Téléchargez le document](#)

Cigarette électronique



Avis du 22 février 2016 relatif aux bénéfices-risques de la cigarette électronique ou e-cigarette étendus en population générale

HCSP Commission spécialisée Prévention, éducation et promotion de la santé, 2016, 26 p.

Le HCSP actualise son avis du 25 avril 2014 relatif aux bénéfices-risques de la cigarette électronique étendus en population générale.

Des travaux du HCSP, il ressort que la cigarette électronique :

- peut être considérée comme une aide pour arrêter ou réduire la consommation de tabac des fumeurs ;
- pourrait constituer une porte d'entrée dans le tabagisme ;
- induit un risque de renormalisation de la consommation de tabac compte tenu de l'image positive véhiculée par son marketing et sa visibilité dans les espaces publics.

[Téléchargez le document](#)



Cigarette électronique. Outils pour les médecins

Aiduce, 2016,

L'Aiduce (Association Indépendante Des Utilisateurs de Cigarette Electronique), association d'usagers disposant d'un comité scientifique, met à disposition des médecins généralistes des outils d'information : – un livret sur les « idées reçues » qui analyse les différents discours sur la vape, qui peuvent soulever dans la population générale des craintes ou des espoirs infondés.– un livret « tout savoir pour débiter la vape », qui pourra être remis aux patients et qui leur permettra de comprendre l'utilisation pratique du dispositif et des e-liquides.

[Téléchargez le livret idées reçues; le livret "tout savoir pour débiter la vape"](#)

Alcool



Alcool et médecine générale. Recommandations cliniques pour le repérage précoce et les interventions brèves

Anderson P., Gual A., Colom J., INCa (trad.), 2008, 141 p.

[Téléchargez le document](#)



Mésusage de l'alcool : dépistage, diagnostic et traitement, Recommandations de bonne pratique d'après la méthode de recommandations pour la pratique clinique

Société Française d'Alcoologie, février 2015, 148 p.

La SFA publie des recommandations de bonne pratique dans le cadre du mésusage d'alcool afin d'améliorer la qualité des prises en charge.

[Téléchargez le document](#)

Baclofène



Réduction de la dose maximale de baclofène à 80mg par jour dans le cadre de la Recommandation Temporaire d'Utilisation (RTU) - Communiqué

ANSM, 25/07/2017

Pour sécuriser l'utilisation du baclofène chez les patients alcoolo-dépendants dans le cadre de la RTU, l'ANSM en modifie le protocole en réduisant la dose maximale prescrite dans la prise en charge de ces patients. A compter du 24 juillet 2017, la RTU ne permet plus de prescrire du baclofène à des posologies supérieures à 80 mg/jour.

[Lire le point d'information](#)



Baclofène, pour qui et surtout comment?

Dr Philippe Masson, Pr Christophe Lançon, Dr Richard Lopez, et al., RVH Synergie, 2017

Cet article propose une série de réflexions issues de la pratique clinique quotidienne. Il aborde successivement les questions de l'éligibilité des personnes au traitement, des modalités de prescription (posologie, rythme de prise) et des objectifs thérapeutiques. Il se termine par quelques vignettes cliniques.

[Téléchargez l'article](#)

Réduction des risques alcool

Réduction des risques alcool. Guide de la réduction des risques et des dommages chez les consommateurs d'alcool

Strasbourg, ARS Alsace, 2015, 79 p.

Ce guide, fruit d'un travail collaboratif entre professionnels de l'addictologie œuvrant en Alsace, vise à fournir aux professionnels des différents champs des clés de compréhension permettant d'aborder toutes les dimensions de l'usage d'alcool, de favoriser l'appropriation des concepts, des enjeux et des outils de la réduction des risques et des dommages liés à la consommation d'alcool ainsi que leur intégration dans les postures professionnelles.

[Téléchargez le guide](#)

Grossesse

Alcool et grossesse, parlons-en. Guide à l'usage des professionnels

Ministère du travail, de l'emploi et de la santé ; DGS, 2011, 48 p.

L'objectif de ce guide est de prévenir l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation foetale (ETCAF) en intervenant auprès des femmes enceintes.

[Téléchargez le guide](#)

Produits illicites

Opiacés –TSO

Prescription et dispensation des médicaments de substitution aux opiacés

Ordre national des médecins, ordre national des pharmaciens, 2017, 22 p.

Sommaire

Les fondamentaux

- 1- Le rôle majeur des professionnels de santé prenant en charge ces patients
- 2- Rappel des principes déontologiques et des obligations légales: toute prescription de produit de substitution aux opiacés repose sur des préalables incontournables -
- 3- Règles spécifiques liées à la prescription et à la dispensation des produits de substitution
- 4- Recommandations ordinales pratiques en matière de prescription et de dispensation des médicaments de substitution aux opiacés
- 5- Les évolutions attendues pour améliorer la prise en charge du patient et mieux accompagner les professionnels de santé
- 6- Codéine et autres médicaments, désormais sur prescription

[Téléchargez le document](#)



Vidéos en ligne sur le site « Intervenir Addictions » - Rubrique « Santé de ville »



Initialisation d'un traitement à la buprénorphine en médecine de ville : articulation pharmacien / médecin généraliste

[Voir la vidéo](#)

Mon test de grossesse est positif

[Voir la vidéo](#)

Un bilan bucco-dentaire

[Voir la vidéo](#)



Prise en charge des troubles de consommation d'opioïdes en première ligne : Abstinence, méthadone ou buprénorphine-naloxone?

Anita Srivastava, Journal du college des médecins de famille du Canada, mars 2017

Objectif : Conseiller les médecins quant aux options thérapeutiques à recommander à des populations précises de patients : approche axée sur l'abstinence, traitement d'entretien par la buprénorphine-naloxone ou traitement d'entretien par la méthadone.

[Lire l'article en ligne](#)



Fiches patients Synergie

Dr Bernard Batejat, Dr Karima Koubaa, Dr Sylive Balteau et al.

La rédaction du Flyer s'est engagée à réaliser une série de fiches destinées aux patients permettant une information pratique sur différentes problématiques.

- Méthadone et examens biologiques.
- L'arrêt du traitement par la méthadone
- Grossesse et méthadone
- Méthadone et transpiration excessive
- Changement de traitement de substitution
- Méthadone et problèmes dentaires
- Méthadone et prise de poids
- Méthadone et hépatite C

[Téléchargez les fiches](#)



Spray nasal de naloxone (Nalscue) : entrée en vigueur de l'AMM le 8 janvier 2018

ANSM, 8 janvier 2018

[Lire le point d'information](#)



L'ANSM publie la liste des médicaments contenant de la codéine, du dextrométhorphan, de l'éthylmorphine ou de la noscapine désormais disponibles uniquement sur ordonnance - Point d'Information

ANSM, 17/07/2017

[Lire le point d'information](#)



Echelle ORT : évaluation du risque de mésusage avant prescription d'un antalgique opioïde
 OFMA, Observatoire Français des médicaments antalgiques
[Téléchargez le document](#)

Cocaïne

Prise en charge des consommateurs de cocaïne – Guide de bonnes recommandations
 HAS, 2010
[Consultez le site internet](#)

Augmentation des signalements d'intoxication liée à la consommation de cocaïne et de crack - Point d'Information

ANSM, 25 janvier 2018

Dans les intoxications rapportées, la cocaïne poudre (chlorhydrate) est la substance consommée principalement, devant le « crack » ou « free base » (cocaïne base) et dans une moindre mesure l'association des deux. La forme « crack », qui possède un potentiel addictif plus important que la cocaïne poudre et dont le mode de consommation par inhalation expose à un risque de complications plus graves, voit sa part de consommation augmentée par rapport à la cocaïne poudre (33 % en 2017 contre 20 à 25 % entre 2013 et 2016). Les complications les plus fréquentes sont des complications psychiatriques (35 %), cardio-vasculaires (30 %) et neurologiques (27 %). Des complications infectieuses (12 %), des complications touchant le système respiratoire (8 %) et ORL (3 %) sont également rapportées.

[Lire le point d'information](#)

Cocaïne et crack. Que retenir ?

Centre d'addictovigilance de Montpellier

Cette fiche synthétise les effets de ces 2 produits, les risques en cas d'intoxication, leurs conséquences et les principales données issues de l'enquête Oppidum.

[Téléchargez la plaquette](#)

Cannabis

Guide pratique des principaux outils de repérage de l'usage problématique de cannabis chez les adolescents

I. OBRADOVIC, OFDT, 2013, 118 p.

Ce guide vise à offrir une aide pratique aux professionnels de santé de première ligne confrontés aux adolescents pour repérer un éventuel usage problématique de cannabis. Il décrit les principaux questionnaires qui permettent un repérage rapide et non stigmatisant de l'usage problématique de cannabis. Il se limite à présenter les outils brefs et/ou simples d'utilisation, spécifiquement destinés au repérage d'un usage problématique de cannabis, sans évoquer les questionnaires permettant de fournir une évaluation de la situation du patient, ni les outils de diagnostic à strictement parler. Il s'agit de dresser un inventaire des instruments de détection de risques potentiellement associés à l'usage de cannabis chez les adolescents.

[Téléchargez le guide](#)



Médicaments



Plaquette d'information sur le risque d'abus et de mésusage du zolpidem

Prescription obligatoire de Zolpidem sur ordonnance sécurisée. Point d'informations CEIP, Service de pharmacologie clinique de Marseille, 2017

[Téléchargez la plaquette](#)



Méthylphénidate : données d'utilisation et de sécurité d'emploi en France - Point d'Information

ANSM, 11/05/2017

[Lire le point d'information](#)



Zolpidem et kétamine

Bulletin addictovigilance, n°4, Juin 2017

Au sommaire, des rappels pharmacologiques, des produits détournés et surveillés, ce qui change, des ordonnances sécurisées.

[Téléchargez le bulletin](#)

HEP Drug Interaction Checker

[Consultez le site internet](#)

Jeu vidéo



Les usages problématiques des jeux vidéo

Psychotropes, Vol.18, n°3-4, 2012, 88 p

[Téléchargez la revue](#)

VIH - VHC



Réévaluation de la stratégie de dépistage de l'infection à VIH en France

HAS, mars 2017

[Consultez le site internet](#)



ALD n°6 - Hépatite chronique C

HAS, juillet 2017

[Consultez le site internet](#)

Réduction des risques

Réduire les risques – éthique, posture et pratiques

Fédération Addiction, Coll. Pratique(s), 2017, 78 p.

Ce guide s'articule en 3 grandes chapitres : Clinique de la réduction des risques, questionnements d'acteurs et complémentarités des dispositifs, contextes, pratique(s) et enjeux.

[Téléchargez le document](#)

Sélection de sites internet

Addict Aide

Consultez la page "[le cabinet medical](#)" Consultez la page [« la maison des professionnels de santé »](#)

Le portail des acteurs de santé - Site partenarial pour les professionnels de santé de premier recours

[Consultez le site internet](#)

Site de référence des tests en addictologie pour évaluer les patients - Association Eclat Graa

[Consultez le site internet](#)

Alcool : dépistage, intervention rapide et orientation -Site canadien pour les professionnels de santé

[Consultez le site internet](#)

Cannabis : repères pour intervenir - Fiches d'intervention élaborées par des spécialistes en addictologie et en médecine générale.

[Consultez le site internet](#)

Le pôle MG Addiction au sein de la Fédération Addiction

[Consultez le site internet](#)

Tabac Info Service - Espace professionnels de santé

[Consultez le site internet](#)

Syndicat des éditeurs de Logiciel de loisir

[Consultez le site internet](#)